

Листок-вкладыш: информация для пациента

**Метродент, гель стоматологический,
гель стоматологический (клубничный)
гель стоматологический (ананасовый)
гель стоматологический (лимонный)**

10 мг/г+0,5 мг/г

Действующие вещества: Метронидазол+Хлоргексидин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки, или медицинской сестры.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу, или работнику аптеки, или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7-10 дней Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ЛИСТКА

1. Что из себя представляет препарат Метродент, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Метродент.
3. Применение препарата Метродент.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Метродент.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

МИНЗДРАВ РОССИИ
19.10.2022
СОГЛАСОВАНО

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ МЕТРОДЕНТ, И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Метродент содержит действующие вещества: метронидазол и хлоргексидин и является противомикробным средством.

Показания к применению

Препарат Метродент предназначен для местного применения у взрослых при инфекционно-воспалительных заболеваниях пародонта и слизистой оболочки полости рта:

- острый и хронический (отечный, гиперпластический, десквамативный) гингивит (воспаление десен);
- острый язвенно-некротический гингивит Венсана;
- острый и хронический пародонтит;
- юношеский пародонтит;
- пародонтоз, осложненный гингивитом;
- афтозный стоматит;
- хейлит;
- воспаление слизистой оболочки полости рта при ношении протезов;
- постэкстракционный альвеолит (воспаление лунки после удаления зуба);
- периодонтит, периодонтальный абсцесс (в составе комбинированной терапии).

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7-10 дней Вам следует обратиться к врачу.

2. О ЧЕМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА МЕТРОДЕНТ

Противопоказания

Не применяйте препарат Метродент если у Вас:

- аллергия к метронидазолу, хлоргексидину, производным нитроимидазола или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.
- заболевания системы крови, в том числе в анамнезе;
- заболевания периферической и центральной нервной системы;
- возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Применение препарата Метродент не заменяет гигиенической чистки зубов, поэтому во время курса лечения препаратом необходимо продолжать чистку зубов.

Препарат Метродент следует хранить в недоступном для детей месте. При случайном или преднамеренном проглатывании препарата ребенком следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Препарат Метродент содержит метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат и пропиленгликоль

Метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат могут вызывать аллергические реакции (в том числе отсроченные). Пропиленгликоль может раздражать кожу.

Дети

Безопасность и эффективность применения препарата Метродент у детей до 18 лет не установлена. При случайном или преднамеренном проглатывании препарата ребенком следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Другие препараты и препарат Метродент

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

При местном применении в рекомендованных дозах препарата Метродент его взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, считаете, что возможно Вы беременны, или планируете беременность, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом до начала приема данного лекарственного препарата.

В связи с отсутствием данных, безопасность применения препарата при беременности и в период грудного вскармливания не установлена. Не рекомендуется применение препарата в период беременности. В период грудного вскармливания при необходимости назначения препарата следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами

Отсутствуют сведения о влиянии препарата на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕТРОДЕНТ

Рекомендуемая доза:

При воспалении десен (гингивите):

Метродент наносится на десна тонким слоем пальцем или при помощи ватной палочки 2 раза в день. Длительность курса лечения составляет в среднем 7-10 дней.

При пародонтите:

После снятия зубных отложений, пародонтальные карманы обрабатываются препаратом Метродент, и производится его нанесение на область десен. Препарат Метродент должен оставаться в месте нанесения в течение 30 минут. Количество процедур зависит от тяжести заболевания. В дальнейшем нанесение геля Вы можете проводить самостоятельно. Препарат Метродент наносится на область десен 2 раза в день в течение 7-10 дней.

При афтозном стоматите:

Препарат Метродент наносится на пораженную область слизистой оболочки полости рта 2 раза в день в течение 7-10 дней.

Для профилактики обострений хронического гингивита и пародонтита:

Препарат Метродент наносится на область десен 2 раза в день в течение 7-10 дней. Профилактические курсы проводятся 2-3 раза в год.

Для профилактики постэкстракционного альвеолита:

После удаления зуба лунка обрабатывается препаратом Метродент, затем препарат применяется 2-3 раза в день в течение 7-10 дней.

Способ введения

Местно, только для стоматологического применения. После нанесения геля следует воздержаться от питья и приема пищи в течение 30 минут. Смыть гель не рекомендуется.

Дети

Безопасности и эффективность препарата Метродент у детей в возрасте до 18 лет на данный момент не установлены.

Если Вы применили препарата Метродент больше, чем следовало:

Случайное или преднамеренное проглатывание большого количества геля может стать причиной усиления побочных эффектов, обусловленных в основном, метронидазолом (хлоргексидин практически не всасывается из желудочно-кишечного тракта).

Симптомы передозировки: тошнота, рвота, головокружение, в более тяжелых случаях – парестезии (необычные ощущения на коже, например жжения, покалывания, ползания мурашек и др.) и судороги. При возникновении симптомов передозировки обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки или медицинской сестре.

Лечение: промывание желудка, при необходимости симптоматическая терапия.

Если Вы забыли применить препарат Метродент

Не стоит принимать двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Следующую дозу следует применить в назначенное время.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

При местном применении препарата Метродент, могут наблюдаться аллергические реакции:

частота неизвестна: кожная сыпь, зуд, крапивница, анафилактические реакции, в том числе, анафилактический шок, а также головная боль.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1

Тел.: +7 (495) 698-45-38, +7 (499) 578-02-30

Адрес электронной почты: pharm@roszdravnadzor.gov.ru (для держателей регистрационных удостоверений и производителей лекарственных препаратов), npr@roszdravnadzor.gov.ru (для медицинских организаций).

Интернет-сайт: www.roszdravnadzor.ru

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА МЕТРОДЕНТ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе и пачке картонной, после слов «Годен до:..».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25°C. Не замораживать.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Препарат Метродент содержит на 1 г препарата:

Действующие вещества: метронидазола бензоат 16 мг (эквивалентно метронидазолу 10) мг; хлоргексидина биглюконат раствор 20% 2,5 мг (эквивалентно хлоргексидину 0,5 мг).

Вспомогательные вещества: карбомер-934р, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, пропиленгликоль, натрия сахарината дигидрат, полисорбат 60, левоментол, троламин, ароматизаторы: ананасовый или лимонный или клубничный, вода очищенная.

Внешний вид и содержимое упаковки:

Гель стоматологический: однородный гель от бесцветного до бесцветного со слегка желтоватым оттенком цвета, со специфическим запахом ментола.

Гель стоматологический (ананасовый): однородный гель от бесцветного до бесцветного со слегка желтоватым оттенком цвета, со специфическим запахом ментола и слабым запахом ананаса.

Гель стоматологический (клубничный): однородный гель от бесцветного до бесцветного со слегка желтоватым оттенком цвета, со специфическим запахом ментола со слабым запахом клубники.

Гель стоматологический (лимонный): однородный гель от бесцветного до бесцветного со слегка желтоватым оттенком цвета, со специфическим запахом ментола со слабым запахом лимона.

Упаковывают в тубу из ламинированного алюминия, горлышко которой запечатано алюминиевой фольгой, с навинчивающейся крышкой. По 1 тубе вместе с листком-вкладышем вкладывают в пачку картонную.

Держатель регистрационного удостоверения претензии потребителей направлять по адресу:

Республика Беларусь

ООО «КБ-Фарма»

Юридический (фактический) адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65Б, пом. 145/23.

Телефон: +7 (495) 477-30-04

email: PV@expert-lc.ru

Претензии потребителей направлять по адресу:

Республика Беларусь

ООО «КБ-Фарма»

Юридический (фактический) адрес: г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65Б, пом. 145/23.

Телефон: +7 (495) 477-30-04

email: PV@expert-lc.ru

Листок – вкладыш пересмотрен